

使用に際して、この説明文書を必ず読むこと。また、必要な時に読めるよう大切に保管すること。



ストレージタイプG

漢方製剤 はんげしゃしんとう〈半夏瀉心湯〉

特徴

第2類医薬品

- ストレスなどで胃の調子が悪い、下痢・軟便、などといった症状に、漢方処方「半夏瀉心湯」が優れた効果をあらわします。
- 不安や緊張を感じやすい神経症の方にも適したお薬です。
- 体力中等度で、みぞおちがつかえた感じがある方に適したお薬です。
- のみやすい黄かっ色の顆粒です。

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師または薬剤師に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦または妊娠していると思われる人。
- (3) 高齢者。
- (4) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- (5) 次の症状のある人。
むくみ
- (6) 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師または薬剤師に相談すること

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	せきを伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸（皮ふや白目が黄色くなる）等があらわれる。

- (2) 1ヵ月位（急性胃腸炎、二日酔、げっぷ、胸やけに服用する場合には5〜6回）服用しても症状がよくなる場合

3. 長期連用する場合には、医師または薬剤師に相談すること

（裏面へ続く）

効能

体力中等度で、みぞおちがつかえた感じがあり、ときに悪心、嘔吐があり食欲不振で腹が鳴って軟便または下痢の傾向のあるものの次の諸症：

急・慢性胃腸炎、下痢・軟便、消化不良、胃下垂、神経性胃炎、胃弱、二日酔、げっぷ、胸やけ、口内炎、神経症

用法・用量

次の量を、食前に水またはお湯で服用すること。

年齢	1回量	1日服用回数
15歳以上	1包	2回
7歳～14歳	2/3包	
4歳～6歳	1/2包	
2歳～3歳	1/3包	
2歳未満	服用しないこと	

<用法・用量に関連する注意>

- (1)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- (2)用法・用量を厳守すること。

成分

2包(3.75g、15歳以上の1日服用量)中に次の成分を含有する。

半夏瀉心湯エキス …………… 2.25g(乾燥エキスとして)

ハンゲ(半夏) …………… 2.5g	タイソウ(大棗) …………… 1.25g
オウゴン(黄芩) …………… 1.25g	ニンジン(人参) …………… 1.25g
カンキョウ(乾姜) …………… 1.25g	オウレン(黄連) …………… 0.5g
カンゾウ(甘草) …………… 1.25g	上記生薬より抽出

添加物：シヨ糖脂肪酸エステル、乳糖水和物、ステアリン酸Mg

<成分に関連する注意>

生薬を用いた製品なので、製品により顆粒の色調が多少異なることがありますが、効果には変わりありません。

保管および取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に箱に入れて保管すること。
- (2)小児の手の届かない所に保管すること。
- (3)使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。
- (4)1包を分割して服用した残りは、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用すること。

包装

6包(1.875g×6)、12包(1.875g×12)

本製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。

武田薬品工業株式会社 ヘルスケアカンパニー「お客様相談室」
〒103-8668 東京都中央区日本橋二丁目12番10号 ☎0120-567087
受付時間：9：00～17：00（土、日、祝日を除く）

- タケダ健康サイト(パソコン用) <http://takeda-kenko.jp>
- タケダ健康モバイルサイト(携帯電話用) <http://tkdm.jp>

販売元  **武田薬品工業株式会社**

〒540-8645 大阪市中央区道修町四丁目1番1号

製造販売元 **株式会社 ツムラ**

〒107-8521 東京都港区赤坂二丁目17番11号